

2020

Gedeon Richter
portofoliu de produse



Cercetare. Inovare. Implicare. Din 1901.



GEDEON RICHTER

CUPRINS

Tractul digestiv _____ 9

- QUAMATEL®** (famotidină)
comprimate 10 mg N14, 20 mg N28, 40 mg N14, 20 mg sol. inj.N5+5 _____ 10
- STOPDIAR®** (nifuroxazidă)
comprimate 100 mg N24; capsule 200 mg N12; 220 mg / 5 ml suspensie orală 90 ml _____ 10

Sistemul cardiovascular _____ 11

- PANANGIN®**
(aspartat de magneziu tetrahidrat 175 mg, aspartat de potasiu hemihidrat 166,30 mg) _____ 13
- PANANGIN® FORTE**
(aspartat de magneziu tetrahidrat 350 mg, aspartat de potasiu hemihidrat 332,60 mg) _____ 13
- PANANGIN®**
(aspartat de magneziu tetrahidrat 400 mg, aspartat de potasiu hemihidrat 452 mg)
concentrat pentru soluție perfuzabilă _____ 13
- DIROTON®** (lisinopril)
comprimate 5mg, 10mg, 20mg N56 _____ 14
- EKVATOR®** (lisinopril + amlodipină)
comprimate 10mg + 5mg N30 _____ 14
- NORMODIPIN®** (amlodipină)
comprimate 5mg, 10mg N30 _____ 14
- SENTOR®** (losartan)
comprimate 50mg, 100mg N30 _____ 15
- CO-SENTOR®** (losartan + hidroclortiazidă)
comprimate 50mg + 12.5mg N30, 100mg + 25mg N30 _____ 15
- IMPAMID® SR** (indapamidă)
comprimate 1.5mg N30 _____ 15
- PREDIZIN®** (trimetazidină)
comprimate filmate 35mg N60 _____ 16
- MERTENIL®** (rosuvastatină)
comprimate 5mg, 10mg, 20mg N30 _____ 16
- VEROSPIRON®** (spironolactonă)
capsule 50 mg N30
comprimate 25 mg N20 _____ 16
- EKVAMER®** (lisinopril + amlodipină + rosuvastatină)
capsule 10 mg/5 mg/10 mg N 30
capsule 10 mg/5 mg/20 mg N30

capsule 20 mg/10 mg/10 mg N30	
capsule 20 mg/10 mg/20 mg N30	17
BIDOP® (bisoprolol)	
comprimate 2,5mg, 5mg, 10mg N28	18
RAENOM® (ivabradină)	
comprimate 5mg N56, 7,5mg N56	18

Aparatul genito-urinar și hormonii sexuali _____ 19

BELARA® (0,03 mg etinilestradiol și 2 mg acetat de clormadinonă)	
comprimate filmate N21, N21x3	21
DIMIA® (0,02 mg etinilestradiol și 3 mg drospirenonă)	
comprimate filmate N24+4	21
SAWIS (dienogest 2 mg)	
comprimate 2mg N28	22
MIDIANA® (0,03 mg etinilestradiol și 3 mg drospirenonă)	
comprimate filmate N21	22
DONASERT®	
(20 micrograme/24 ore sistem cu cedare intrauterină cu Levonorgestrel)	22
LINDYNETTE® 20 (0,02 mg etinilestradiol și 0,75 mg gestoden)	
comprimate filmate N21x3	23
REGULON® (0,03 mg etinilestradiol și 0,15 mg desogestrel)	
comprimate filmate N21x3	23
RIGEVIDON® (0,02 mg etinilestradiol și 0,15 mg levonorgestrel)	
comprimate filmate N21x3	23
ESCAPELLE® (levonorgestrel)	
comprimate 1,5 mg N1	24
POSTINOR® (levonorgestrel)	
comprimate 0,75 mg N2	24
LENZETTO® (spray transdermic, cu estradiol 1,53 mg/doză)	
56 pulverizări	24
MYCOSYST® (fluconazol)	
capsule: 50 mg N7; 100 mg N28 ; 150 mg N1 și 150 mg N2	25
KLION-D 100 (metronidazol/nitrat de miconazol)	
comprimate vaginale 100 mg/100 mg	25
TAMSOL® (tamsulosin)	
capsule 0,4 mg N30	26
PROSTERID® (finasteridă)	
comprimate 5 mg N.28	26

Sistemul nervos central _____ 27

FASCONAL®

(acid acetilsalicilic 200 mg, paracetamol 200 mg, fosfat de codeină hemihidrat 10 mg, cafeină anhidră 25 mg) _____ 29

FASCONAL® PRO

(paracetamol 500 mg, propifenazonă 300 mg, cafeină 75 mg) _____ 29

PREGABALIN-RICHTER® (pregabalină)

capsule 75 mg, 150 mg, 300 mg, N56 _____ 29

CAVINTON® (vinpocetină)

comprimate 5 mg N50, 10 mg N30; soluție perfuzabilă 10 mg/2 ml N10 _____ 30

MEMANTINE-RICHTER® (memantină)

comprimate filmate 10 mg N30, N60 _____ 30

TEBANTIN® (gabapentină)

capsule 300 mg N50 _____ 30

Psihiatrie _____ 31

REAGILA® (cariprazină)

capsule 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg, N28 _____ 32

AMDOAL® (aripiprazol)

comprimate 10 mg, 15 mg, N30 _____ 32

LENUXIN® (escitalopram)

comprimate filmate 10 mg N28 _____ 32

Preparate dermatologice _____ 33

TERBISIL® (terbinafină)

comprimate 250 mg N28 _____ 35

TERBISIL® (terbinafină)

cremă 10 mg/g 15 g _____ 35

CURIOSIN® GEL (hialuronat de zinc)

cremă 15 g _____ 35

FTOROCORT®

(un gram de unguent conține 1 mg de triamcinolon acetonid)
unguent 1 mg/g _____ 36

AUROBIN®

(un gram de unguent conține 2 mg caproat de prednisolonă,
20 mg clorhidrat de lidocaină și 20 mg dexpantenol)
unguent 2 mg/20 mg/20 mg/g _____ 36

Aparatul respirator _____ 37

GROPRINOSIN® (inosină pranobex)

comprimate 500 mg N20, N50; sirop 250 mg/5 ml 150 ml N1 _____ 38

LORDESTIN® (desloratadină)

comprimate 5 mg N30; soluție orală 0,5 mg/ml 60 ml N1 _____ 38

Sistemul musculoscheletic _____ 39

AIRTAL® (aceclofenac)

comprimate 100 mg N60; pulbere pentru suspensie orală 100mg/3 g N20 _____ 41

AIRTAL® CREMĂ (aceclofenac)

cremă 15 mg/g 60g N1 _____ 41

MYDOCALM® (tolperizonă)

comprimate filmate 150 mg N30 _____ 42

OSTALON® (acid alendronic)

comprimate filmate 70 mg N4 _____ 42

Produse antiparazitare _____ 43

VERMOX® (mebendazol)

comprimate 100 mg N6 _____ 44

DECARIS® (levamisol)

comprimate 50 mg N2; comprimate 150 mg N1 _____ 44



Tractul digestiv



QUAMATEL® (famotidină)

comprimate 10 mg N14, 20 mg N28, 40 mg N14, 20 mg sol. inj.N5+5

Grupa farmacoterapeutică:

Antagoniști ai receptorilor H₂-histaminergici

Indicații terapeutice

- Ulcer duodenal
- Ulcer gastric benign
- Boala de reflux gastro-esofagian
- Alte maladii însoțite de hipersecreția sucului gastric (de exemplu sindromul Zollinger-Ellison)
- Profilaxia recidivelor ulcerose
- Profilaxia sindromului de aspirație în anestezia generală (sindrom Mendelson)



STOPDIAR® (nifuroxazidă)

comprimate 100 mg N24; capsule 200 mg N12; 220 mg /5 ml suspensie orală 90 ml

Grupa farmacoterapeutică:

Antidiareice, antiinflamatorii/antiinfecțioși agenți intestinali, antiinfecțioase intestinale, altele

Indicații terapeutice

- Diaree acută și cronică de origine bacteriană
- Alte boli asociate cu diaree, de exemplu, intoxicații alimentare acute





Sistemul cardiovascular



PANANGIN®

(aspartat de magneziu tetrahidrat 175 mg, aspartat de potasiu hemihidrat 166,30 mg)

Grupa farmacoterapeutică: Suplimente minerale, alte produse minerale

Indicații terapeutice

- Tratament adjuvant al afecțiunilor cardiace cronice (insuficiență cardiacă, pacienți post-infarct) și aritmie cardiacă (ventriculară, primară), cu aprobarea medicului curant
- Adjuvant în tratamentul cu digitalice
- Ca supliment pentru creșterea aportului alimentar de magneziu și potasiu



PANANGIN® FORTE

(aspartat de magneziu tetrahidrat 350 mg, aspartat de potasiu hemihidrat 332,60 mg)

Grupa farmacoterapeutică: Suplimente minerale, alte produse minerale

Indicații terapeutice

- Tratament adjuvant al afecțiunilor cardiace cronice (insuficiență cardiacă, pacienți post-infarct) și aritmie cardiacă (ventriculară, primară), cu aprobarea medicului curant
- Adjuvant în tratamentul cu digitalice
- Ca supliment pentru creșterea aportului alimentar de magneziu și potasiu



PANANGIN®

(aspartat de magneziu tetrahidrat 400 mg, aspartat de potasiu hemihidrat 452 mg)
concentrat pentru soluție perfuzabilă

Grupa farmacoterapeutică: Substanțe minerale, magneziu

Indicații terapeutice

- Tratament adjuvant al afecțiunilor cardiace cronice (insuficiență cardiacă, perioada post-infarct) și aritmie cardiacă (ventriculară, primară)
- Adjuvant în tratamentul cu digitalice



DIROTON® (lisinopril)

comprimate 5mg, 10mg, 20mg N56

Grupa farmacoterapeutică:

Antihipertensiv, Inhibitor al enzimei de conversie

Indicații terapeutice

- Hipertensiune arterială
- Tratamentul insuficienței cardiace simptomatice
- Infarct miocardic acut. Tratamentul de scurtă durată (6 săptămâni) la pacienți stabili hemodinamic, în primele 24 ore de la un infarct miocardic acut
- Tratamentul bolii renale la pacienții hipertensivi cu diabet zaharat tip 2 și nefropatie incipientă



EKVATOR® (lisinopril + amlodipină)

comprimate 10mg + 5mg N30

Grupa farmacoterapeutică:

Antihipertensiv combinat

Indicații terapeutice

- Tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale la adulți



NORMODIPIN® (amlodipină)

comprimate 5mg, 10mg N30

Grupa farmacoterapeutică:

Blocant al canalelor de calciu

Indicații terapeutice

- Hipertensiune arterială
- Angină pectorală cronică stabilă
- Angină pectorală vasospastică (Prinzmetal)



SENTOR® (losartan)

comprimate 50mg, 100mg N30

Grupa farmacoterapeutică: Blocant al AT II - receptori

Indicații terapeutice

- Tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale la adulți, copii și adolescenți cu vârsta de 6 până la 18 ani
- Tratamentul bolii renale la pacienții adulți cu hipertensiune arterială și diabet zaharat tip 2, cu proteinurie $\geq 0,5$ g/zi, ca parte a unui tratament antihipertensiv.
- Tratamentul insuficienței cardiace cronice la pacienții adulți, atunci când tratamentul cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (ECA) nu mai este considerat adecvat din cauza reacțiilor adverse, în special tuse sau din cauza contraindicației
- Reducerea riscului de accident vascular cerebral la pacienții adulți hipertensivi cu hipertrofie ventriculară stângă, documentată prin ECG



CO-SENTOR® (losartan + hidroclortiazidă)

comprimate 50mg + 12.5mg N30, 100mg + 25mg N30

Grupa farmacoterapeutică: Preparat combinat

Indicații terapeutice

- Co-Sentor comprimate filmate este indicat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale la pacienți a căror tensiune arterială nu este controlată corespunzător cu losartan sau hidroclorotiazidă în monoterapie



IMPAMID® SR (indapamidă)

comprimate 1.5mg N30

Grupa farmacoterapeutică:

Diuretic tiazid

Indicații terapeutice

- Hipertensiune arterială esențială



PREDIZIN® (trimetazidină)

comprimate filmate 35 mg N60

Grupa farmacoterapeutică: Preparat metabolic

Indicații terapeutice

- Trimetazidina este indicată la adulți ca terapie suplimentară la tratamentul simptomatic al pacienților cu angină pectorală stabilă, insuficient controlați terapeutic sau care prezintă intoleranță la tratamentele antianginoase de primă linie



MERTENIL® (rosuvastatină)

comprimate 5mg, 10mg, 20mg N30

Grupa farmacoterapeutică: Statine

Indicații terapeutice

- Tratamentul hipercolesterolemiei
- Hipercolesterolemie familială homozigotă
- Prevenirea evenimentelor cardiovasculare



VEROSPIRON® (spironolactonă)

capsule 50 mg N30

comprimate 25 mg N20

Grupa farmacoterapeutică: Antialdosteronic

Indicații terapeutice

- Insuficiență cardiacă congestivă dacă, pacientul nu mai răspunde la alte diuretice și/sau pentru a potența efectul acestora
- Hipertensiune arterială esențială
- Edeme și/sau ascită la pacienții cu ciroză hepatică
- Tratamentul hiperaldosteronismului primar
- Edeme determinate de sindromul nefrotic
- Tratamentul hipokaliemiei când nu este posibilă utilizarea altor metode de tratament



EKVAMER® (lisinopril + amlodipină + rosuvastatină)

capsule 10 mg/5 mg/10 mg N 30

capsule 10 mg/5 mg/20 mg N30

capsule 20 mg/10 mg/10 mg N30

capsule 20 mg/10 mg/20 mg N30

Grupa farmacoterapeutică:

Preparat combinat

Indicații terapeutice

Ekvamer este indicat ca terapie de substituție pentru acei pacienți adulți care sunt controlați în mod adecvat cu lisinopril, amlodipină și rosuvastatină administrate concomitent la același nivel de doză ca în combinația pentru tratamentul hipertensiunii esențiale la pacienții cu una dintre următoarele afecțiuni și condiții:

- Hipercolesterolemia primară (Fredrickson de tip IIa excluzând hipercolesterolemia familială heterozigotă) sau dislipidemia mixtă (tip IIb) atunci când răspunsul la dietă și alte tratamente non-farmacologice (ex. exerciții fizice, reducere în greutate) sunt inadecvate
- Hipercolesterolemia familială homozigotă în plus față de dieta și alte tratamente de scădere a lipidelor sau atunci când dieta și alte tratamente de scădere a lipidelor (de exemplu, LDL afereza) nu sunt adecvate
- Hipertrigliceridemia (tip Fredrickson de tip IV)




BIDOP[®] (bisoprolol) comprimate 2,5mg, 5mg, 10mg N28

Grupa farmacoterapeutică:

Beta-blocante selective

Indicații terapeutice

- Hipertensiune arterială
- Cardiopatie ischemică (profilaxia acceselor de angină pectorală stabilă)
- Insuficiență cardiacă cronică



RAENOM[®] (ivabradină) comprimate 5mg N56, 7,5mg N56

Grupa farmacoterapeutică:

Inhibitor al If canalelor

Indicații terapeutice

- Tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile cu boală coronariană și ritm sinusal normal și frecvență cardiacă ≥ 70 bătăi per minut (bpm), la adulți care au intoleranță sau contraindicație la utilizarea de beta-blocante sau în asociere cu beta-blocante la pacienți insuficient controlați cu o doză optimă de betablocant
- Tratamentul insuficienței cardiace cronice, clasa II-IV NYHA cu disfuncție sistolică, la pacienți în ritm sinusal și a căror frecvență cardiacă este ≥ 75 bpm, în asociere cu tratamentul standard incluzând beta-blocante sau atunci când tratamentul cu beta-blocante este contraindicat sau nu este tolerat





IWHC
INTERNATIONAL WOMEN'S HEALTHCARE

Aparatul genito-urinar și hormonii sexuali



BELARA®

(0,03 mg etinilestradiol și 2 mg acetat de clormadinonă)
comprimate filmate N21, N21x3

Grupa farmacoterapeutică:

Contraceptiv original hormonal sistemic cu progestativ și estrogen în asociere fixă

Indicații terapeutice

- Contracepție hormonală

Extrabeneficii

- Efect antiandrogenic pronunțat, eficient în tratamentul manifestărilor de hiperandrogenizare (acnee, seboore, hirsutism)
- Regim de administrare 21+7



DIMIA®

(0,02 mg etinilestradiol și 3 mg drospirenonă)
comprimate filmate N24+4

Grupa farmacoterapeutică:

Contraceptiv hormonal sistemic cu progestativ și estrogen în asociere fixă, recomandat până la 25 ani

Indicații terapeutice

- Contracepție hormonală

Extrabeneficii

- Reduce simptomatologia cauzată de excesul de apă și sare în țesuturi (edeme, adaos în greutatea corporală, tensionarea sânilor, balonare, etc.). Posedă o eficacitate maximă în neutralizarea simptomelor SPM/TDPM
- **Nu influențează masa corporală**
- Regim de administrare 24+4



SAWIS (dienogest 2 mg)

comprimate 2mg N28

Grupa farmacoterapeutică:

Hormoni sexuali și modulatori ai sistemului genital, progestogeni

Indicații terapeutice

- Tratamentul endometriozei

Doza de Sawis® este de un comprimat zilnic fără nici o pauză, administrat de preferință la aceeași oră în fiecare zi, cu puțin lichid, după necesitate. Comprimatul poate fi luat cu sau fără alimente. Tratamentul poate fi început în orice zi a ciclului menstrual.



MIDIANA® (0,03 mg etinilestradiol și 3 mg drospirenonă)

comprimate filmate N21

Grupa farmacoterapeutică: Contraceptiv hormonal sistemic cu progestativ și estrogen în asociere fixă recomandat după 25 ani

Indicații terapeutice

- Contracepție hormonală

Extrabeneficii

- Reduce simptomatologia cauzată de excesul de apă și sare în țesuturi (edeme, adaos în greutatea corporală, tensionarea sânilor, balonare, etc.). Posedă o eficacitate maximă în neutralizarea simptomelor SPM/TDPM
- **Nu influențează masa corporală**
- Regim de administrare 21+7



DONASERT®

(20 micrograme/24 ore sistem cu cedare intrauterină cu Levonorgestrel)

Indicații terapeutice

Contracepție hormonală, pe termen lung și tratamentul sângerărilor menstruale abundente

Extrabeneficii

- Donasert - design flexibil pentru inserție ușoară, simplă și cu succes
- La femeile de vârstă fertilă, Donasert® este inserat în interiorul cavității uterine în decurs de șapte zile de la debutul menstruației



LINDYNETTE® 20 (0,02 mg etinilestradiol și 0,75 mg gestoden)

comprimate filmate N21x3

Grupa farmacoterapeutică:

Contraceptiv hormonal sistemic cu progestativ și estrogen, combinație fixă

Indicații terapeutice

- Contracepție hormonală
- Regim de administrare 21+7



REGULON®

(0,03 mg etinilestradiol și 0,15 mg desogestrel)

comprimate filmate N21x3

Grupa farmacoterapeutică:

Contraceptiv hormonal sistemic cu progestativ și estrogen, combinație fixă

Indicații terapeutice

- Contracepție hormonală
- Regim de administrare 21+7



RIGEVIDON®

(0,02 mg etinilestradiol și 0,15 mg levonorgestrel)

comprimate filmate N21x3

Grupa farmacoterapeutică:

Contraceptiv hormonal sistemic cu progestativ și estrogen, combinație fixă

Indicații terapeutice

- Contracepție hormonală
- Regim de administrare 21+7



ESCAPELLE® (levonorgestrel)

comprimate 1,5 mg N1

Grupa farmacoterapeutică:

Hormoni sexuali și modulatorii sistemului genital, contraceptive de urgență

Indicații terapeutice

- Contracepția de urgență în primele 72 ore după un contact sexual neprotejat sau eșecul unei metode contraceptive



POSTINOR® (levonorgestrel)

comprimate 0,75 mg N2

Grupa farmacoterapeutică:

Hormoni sexuali și modulatorii sistemului genital, contraceptive de urgență

Indicații terapeutice

- Contracepția de urgență în primele 72 ore după un contact sexual neprotejat sau ineficacitatea unei metode contraceptive



LENZETTO®

(spray transdermic, cu estradiol 1,53 mg/doză)

56 pulverizări

Indicații terapeutice

- Tratamentul secvențial de substituție hormonală (TSH) pentru simptomele determinate de deficitul de estrogen la femeile aflate în postmenopauză (la femeile la care au trecut cel puțin 6 luni de la ultimele sângerări menstruale sau menopauza indusă chirurgical, cu sau fără păstrarea uterului)
- Lenzetto se administrează o dată pe zi, fie în monoterapie, fie ca tratament continuu secvențial (în asociere cu un progestativ)

Doze și mod de administrare

- Ca doză inițială se administrează o pulverizare dozată o dată pe zi la nivelul pielii uscate și sănătoase a antebrațului
- Creșterea dozei trebuie să fie bazată pe severitatea simptomelor din menopauză ale femeii și trebuie să aibă loc numai după cel puțin 4 săptămâni de tratament continuu cu Lenzetto



MYCOSYST® (fluconazol)

capsule: 50 mg N7; 100 mg N28 ; 150 mg N1 și 150 mg N2

Grupa farmacoterapeutică:

Antimicotice sistemice

Indicații terapeutice

- Candidoze sistemice, incluzând candidemia, candidoze diseminate și alte forme de infecții candidozice invazive
- Candidoza mucoaselor: orofaringiană, bronhopulmonară neinvazivă, esofagiană, cutaneomucoasă, candidoza cronică orală atrofică
- Dermatmicoze; onicomicoze; candidoză cutanată
- Profilaxia recidivelor candidozei vaginale recurente (3 și mai multe recidive pe an)



KLION-D 100

(metronidazol/nitrat de miconazol)

comprimate vaginale 100 mg/100 mg

Grupa farmacoterapeutică:

Antiinfecțioase și antiseptice ginecologice

Indicații terapeutice

- Tratatamentul local al tricomoniazelor și infecțiilor fungice genitale la femei, profilaxia infecțiilor fungice genitale la femei
- Se indică câte un comprimat vaginal, înmuiat în apă, care se introduce profund intravaginal 1 dată pe zi, seara înainte de culcare. Cura de tratament constituie 10 zile



TAMSOL® (tamsulosin)

capsule 0,4 mg N30

Grupa farmacoterapeutică:

Antagonist ai receptorilor alfa-adrenergici

Indicații terapeutice

- Tratamentul simptomelor tractului urinar inferior asociate hiperplaziei benigne de prostată (HBP)

Doze și mod de administrare

- O capsulă zilnic, trebuie să fie administrată după micul dejun sau prima masă a zilei



PROSTERID® (finasteridă)

comprimate 5 mg N.28

Grupa farmacoterapeutică:

Inhibitori de testosteron 5 alfa-reductază

Indicații terapeutice

- Tratamentul și controlul hiperplaziei benigne de prostată (HBP) la pacienții cu prostată mărită pentru: a provoca regresia prostatei mărite, îmbunătățește fluxul urinar și îmbunătățește simptomele asociate cu HBP - reducerea riscului de retenție urinară acută, precum și riscul de intervenții chirurgicale, inclusiv rezecția transuretrală a prostatei (RTUP) și prostatectomiei

Doze și mod de administrare

- Doza recomandată pentru adulți este de un comprimat 5 mg pe zi, cu sau fără alimente





Sistemul nervos central





FASCONAL®

(acid acetilsalicilic 200 mg, paracetamol 200 mg, fosfat de codeină hemihidrat 10 mg, cafeină anhidră 25 mg)

Grupa farmacoterapeutică: Alte analgezice și antipiretice, acid salicilic și derivați

Indicații terapeutice

- Fasconal este indicat în: tratamentul simptomatic al durerilor de intensitate medie sau severă cu diferite localizări: cefalee, migrene, nevralgii, mialgii, artralгии, algii dentare sau în sfera ORL, dismenoree
- Tratamentul simptomatic al febrei



FASCONAL® PRO

(paracetamol 500 mg, propifenazonă 300 mg, cafeină 75 mg)

Grupa farmacoterapeutică: Anilide, paracetamol

Indicații terapeutice

- Tratamentul simptomatic al durerilor ușoare și moderate cu diferite localizări, cum sunt cefalee, algii dentare, dismenoree, durere postoperatorie și reumatică
- Tratamentul durerii și febrei asociate cu răceală și gripă
- Fasconal Pro este indicat la adulți și adolescenți (cu vârsta peste 12 ani)



PREGABALIN-RICHTER® (pregabalină)

capsule 75 mg, 150 mg, 300 mg, N56

Grupa farmacoterapeutică: Antiepileptice, alte antiepileptice

Indicații terapeutice

- Durere neuropată
- Epilepsie
- Tulburarea anxioasă generalizată



CAVINTON® (vinpocetină)

comprimate 5 mg N50, 10 mg N30; soluție perfuzabilă 10 mg/2 ml N10

Grupa farmacoterapeutică: Psihostimulante și nootrope

Indicații terapeutice

- **Neurologie:** Tratamentul diverselor forme de tulburări circulatorii cerebrale: apărute după accidente vasculare cerebrale, demență vasculară, arterioscleroză cerebrală, encefalopatie hipertensivă și post-traumatică, insuficiență vertebrobazilară. Reducerea simptomelor psihice sau neurologice de tulburări circulatorii cerebrale
- **Oftalmologie:** Tratamentul tulburărilor vasculare cronice ale coroidei și retinei
- **ORL:** Tratamentul presbiacuziei de percepție, bolii Menière și tinitusului



MEMANTINE-RICHTER® (memantină)

comprimate filmate 10 mg N30, N60

Grupa farmacoterapeutică: Alte antidemențiale

Indicații terapeutice

- Tratamentul pacienților adulți cu boală Alzheimer de intensitate moderată până la severă



TEBANTIN® (gabapentină)


capsule 300 mg N50

Grupa farmacoterapeutică: Antiepileptice, alte antiepileptice

Indicații terapeutice

- Tratamentul durerilor din cadrul neuropatiei periferice
- Epilepsie





Psichiatrie



REAGILA® (cariprazină)

capsule 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg, 6 mg, N28

Grupa farmacoterapeutică:

Psiholeptice, alte antipsihotice

Indicații terapeutice

- Tratamentul schizofreniei la pacienți adulți



AMDOAL® (aripiprazol)

comprimate 10 mg, 15 mg, N30

Grupa farmacoterapeutică:

Psiholeptice, alte antipsihotice

Indicații terapeutice

- Tratamentul schizofreniei; tratamentul episoadelor maniacale moderate până la severe în tulburarea bipolară I; prevenirea unui nou episod maniacal la adulții care au avut episoade predominant maniacale și au răspuns la tratamentul cu aripiprazol



LENUXIN® (escitalopram)

comprimate filmate 10 mg N28

Grupa farmacoterapeutică:

Antidepresive, inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei

Indicații terapeutice

- Tratamentul epizoadelor depresive majore. Tratamentul tulburărilor de panică însoțite sau nu de agorafobie, anxietate socială, anxietatea generalizată, obsesiv-compulsivă





Preparate dermatologiche





TERBISIL® (terbinafină)

comprimate 250 mg N28

Grupa farmacoterapeutică:

Antifungice pentru uz sistemic

Indicații terapeutice

- Tratamentul onicomicozelor determinate de dermatofiți (infecție micotică a unghiilor)
- Infecții fungice ale pielii, unghiilor și scalpului cauzate de Trichophyton (de exemplu T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans T. violaceum), M. canis și Epidermophyton floccosum
- Tratamentul sistemic al micozelor cutanate extinse severe (tinea corporis), dermatomicoze (tinea cruris), micoza picioarelor (tinea pedis) și infecții ale pielii cauzate de genul Candida. Tinea capitis



TERBISIL® (terbinafină)

cremă 10 mg/g 15 g

Grupa farmacoterapeutică:

Antifungice pentru uz dermatologic, alte antifungice de uz topic

Indicații terapeutice

- Infecții fungice ale pielii produse de dermatofiți - Trichophyton spp. (T.rubrum, T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.violaceum), Microsporum canis, și Epidermophyton floccosum de exemplu tinea pedis (picior de atlet), care afectează tălpile și marginile sale, tinea cruris, tinea corporis. Infecții ale pielii produse de levuri, în special din genul Candida. Tratamentul topic al Pityriasis versicolor cauzat de Pityrosporum orbiculare (cunoscut și ca Malassezia furfur)



CURIOSIN® GEL (hialuronat de zinc)

cremă 15 g

Grupa farmacoterapeutică:

Preparat pentru tratamentul local al acneei

Indicații terapeutice

- Curiosin este indicat pentru tratamentul topic în toate formele de acnee de la ușoară până la moderată, mai ales a comedoanelor și acnee papulo-pustuloase



FTOROCORT®

(un gram de unguent conține 1 mg de triamcinolon acetamid)
unguent 1 mg/g

Grupa farmacoterapeutică:

Glucocorticosteroid cu activitate moderată

Indicații terapeutice

- Afecțiuni cutanate, sensibile la glucocorticosteroizi (inclusiv eczemă, psoriazis vulgar, dermatită alergică)



AUROBIN®

(un gram de unguent conține 2 mg caproat de prednisolonă,
20 mg clorhidrat de lidocaină și 20 mg dexpanenol)
unguent 2 mg/20 mg/20 mg/g

Grupa farmacoterapeutică:

Remedii pentru tratamentul nodulilor hemoroidali și fisurilor anale pentru uz topic

Indicații terapeutice

- Tulburări inflamatorii ale regiunii perianale, inclusiv prurit anal, eczemă și dermatită perianală, hemoroizi, fisură anală





Aparatul respirator



GROPRINOSIN® (inosină pranobex)

comprimate 500 mg N20, N50; sirop 250 mg/5 ml 150 ml N1

Grupa farmacoterapeutică:

Antivirale de uz sistemic, antivirale cu acțiune directă

Indicații terapeutice

- Infecții virale
- Infecții mucocutanate cauzate de virusurile: virus Herpes simplex tip I sau tip II și virusul Herpes varicelo-zosterian
- Ca tratament adjuvant la persoanele cu imunodeficiență în caz de infecții recurente ale tractului respirator superior



LORDESTIN® (desloratadină)

comprimate 5 mg N30; soluție orală 0,5 mg/ml 60 ml N1


Grupa farmacoterapeutică:

Antihistaminice – H1 antagonist

Indicații terapeutice

- Lordestin este indicat la adulți și adolescenți cu vârstă de 12 ani și mai în vârstă pentru ameliorarea simptomelor asociate cu: **rinita alergică; urticaria**





Sistemul musculoscheletic



AIRTAL® (aceclofenac)

comprimate 100 mg N60; pulbere pentru suspensie orală 100 mg/3 g N20

Grupa farmacoterapeutică:

Medicamente antiinflamatoare și antireumatice, nesteroidiene

Indicații terapeutice

- Tratamentul simptomatic al durerilor și inflamațiilor din boala artrozică, poliartrita reumatoidă și spondilita anchilozantă, ca și a altor sindroame dureroase ale aparatului locomotor (de exemplu, periartrită scapulo-humerală și reumatism extra-articular)
- Analgezic în episoade dureroase (inclusiv dureri lombare sau dentare și dismenoree primară)



AIRTAL® CREMĂ (aceclofenac)

cremă 15 mg/g 60g N1

Grupa farmacoterapeutică:

Preparat antiinflamator nesteroidian, antiinflamatoare nesteroidiene de uz topic

Indicații terapeutice

- Tratamentul local al tuturor tipurilor de dureri și inflamații cu diferite cauze locomotorii, incluzând leziuni traumatice
- Medicamentul poate fi utilizat pentru ameliorarea inflamațiilor tendoanelor, ligamentelor, mușchilor și articulațiilor, în cazul luxațiilor, entorselor sau contuziei, precum și în tratamentul lumbago, torticolisului și periartritei.



MYDOCALM® (tolperizonă)

comprimate filmate 150 mg N30

Grupa farmacoterapeutică:

Miorelaxante, alte medicamente cu acțiune centrală

Indicații terapeutice

- Tratamentul simptomatic al spasticității după accident vascular cerebral la adulți



OSTALON® (acid alendronic)

comprimate filmate 70 mg N4

Grupa farmacoterapeutică:

Bifosfonați

Indicații terapeutice

- Tratamentul osteoporozei din post-menopauză





Produse antiparazitare



VERMOX® (mebendazol)

comprimate 100 mg N6

Grupa farmacoterapeutică:

Anthelmintice, derivați de benzimidazol

Indicații terapeutice

- Vermox este indicat pentru tratamentul infestațiilor gastrointestinale simple sau multiple cu *Enterobius vermicularis* (oxiuri), *Ascaris lumbricoides* (ascarizi); *Trichuris trichuria* (tricocefali); *Ancylostoma duodenale* (vermi cu cârlig obișnuiți), *Necator americanus* (vermi cu cârlig de tip american); *Strongyloides stercoralis* (trichină); *Taenia* spp. (viermi plăți)



DECARIS® (levamisol)

comprimate 50 mg N2; comprimate 150 mg N1

Grupa farmacoterapeutică:

Antinematode, derivați de imidazotiazol

Indicații terapeutice

- Decaris este indicat pentru tratamentul infecțiilor cauzate de următoarele specii de viermi gastro-intestinali: *Ascaris lumbricoides*, *Necator americanus* și *Ancylostoma duodenale*



CATALOGUL DE PRODUSE ESTE DISPONIBIL
ȘI ÎN VERSIUNEA ON-LINE.

accesați
www.rg.md



GEDEON RICHTER

Reprezentanța în Republica Moldova, Chișinău, str. A. Pușkin, 47/1, bl. A, of.1;
Tel./Fax: 22-14-49; 22-26-71; www.gedeonrichter.md